

# Sturgeon ALLER BRONZE



## Продукционные корма



### СОСТАВ

|                               | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8 mm |
|-------------------------------|------|--------|------|------|
| Протеин (%)                   | 45   | 45     | 45   | 45   |
| Жир (%)                       | 15   | 15     | 15   | 15   |
| Углеводы (%)                  | 22,3 | 22,3   | 22,3 | 22,3 |
| Зола (%)                      | 6,5  | 6,5    | 6,5  | 6,5  |
| Волокно (%)                   | 3,2  | 3,2    | 3,2  | 3,2  |
| Фосфор (%)                    | 1,1  | 1,1    | 1,1  | 1,1  |
| Энергетическая ценность (МДж) | 21,2 | 21,2   | 21,2 | 21,2 |
| Усваиваемая энергия (МДж)     | 17,6 | 17,6   | 17,6 | 17,6 |

### КОМПОНЕНТЫ

Сырье перечисленно в алфавитном порядке. Полный состав будет указан на этикетке

витамины и минералы, зерновые продукты, морские субпродукты, одноклеточные белки, переработанные животные белки, переработанные животные масла, побочные продукты неморского происхождения, продукты крови, растительные белки, растительные масла, рыбная мука.

### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОГРАММА КОРМЛЕНИЯ

Кг корма на 100 кг рыбы в день

| Рыба (гр) | ММ     | Температура воды в (°C) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|--------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           |        | 10                      | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 26   |
| 50-100    | 3 mm   | 0,21                    | 0,74 | 1,27 | 1,7  | 2,12 | 1,91 | 1,7  | 1,06 | 0,21 |
| 100-200   | 3 mm   | 0,18                    | 0,62 | 1,06 | 1,41 | 1,76 | 1,59 | 1,41 | 0,88 | 0,18 |
| 200-800   | 4.5 mm | 0,15                    | 0,51 | 0,88 | 1,17 | 1,46 | 1,32 | 1,17 | 0,73 | 0,15 |
| 800-1500  | 4.5 mm | 0,12                    | 0,42 | 0,73 | 0,97 | 1,21 | 1,09 | 0,97 | 0,61 | 0,12 |
| 1500-3000 | 6 mm   | 0,1                     | 0,35 | 0,6  | 0,81 | 1,01 | 0,91 | 0,81 | 0,5  | 0,1  |
| 3000-4000 | 6 mm   | 0,08                    | 0,29 | 0,5  | 0,67 | 0,84 | 0,75 | 0,67 | 0,42 | 0,08 |
| 4000-7000 | 8 mm   | 0,07                    | 0,24 | 0,42 | 0,56 | 0,69 | 0,62 | 0,56 | 0,35 | 0,07 |

### ВЛИЯНИЕ КОРМА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

На 100 кг рыбы

|                            | 3 mm |      |      | 4.5 mm |      |      | 6 mm |      |      | 8 mm |      |      |
|----------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Кормовой коэффициент       | 1    | 1,1  | 1,2  | 1,1    | 1,2  | 1,3  | 1,2  | 1,3  | 1,4  | 1,3  | 1,4  | 1,5  |
| Азот в экскриментах (кг)   | 0,58 | 0,63 | 0,69 | 0,63   | 0,69 | 0,75 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 0,86 |
| Азот в воде (кг)           | 3,87 | 4,54 | 5,2  | 4,54   | 5,2  | 5,86 | 5,2  | 5,86 | 6,52 | 5,86 | 6,52 | 7,19 |
| Фосфор в экскриментах (кг) | 0,3  | 0,33 | 0,36 | 0,33   | 0,36 | 0,39 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,39 | 0,42 | 0,45 |
| Фосфор в воде (кг)         | 0,26 | 0,33 | 0,4  | 0,33   | 0,4  | 0,47 | 0,4  | 0,47 | 0,54 | 0,47 | 0,54 | 0,61 |

### ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ИЗМЕРЯЕТСЯ В CO<sub>2</sub>-EQ

Цифры в CO<sub>2</sub> эквиваленте (кг/кг корма)

|                                                      | 3 mm      | 4.5 mm    | 6 mm      | 8 mm      |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CO <sub>2</sub> -экв. с изменением землепользования  | 0,95-3,43 | 0,95-3,43 | 0,95-3,43 | 0,95-3,43 |
| CO <sub>2</sub> -экв. без изменения землепользования | 0,72-2,12 | 0,72-2,12 | 0,72-2,12 | 0,72-2,12 |